

Primula F1



Primula obconica / Примула обконика Серии Grace™ F1, Libre™ F1

Минимальная схожесть: Grace™ – 70%, Libre™ – 80%

Растение восприимчиво к инициации цветения после появления 8 – 10 листьев. Растение короткого дня. В отличие от других примул, обконика не нуждается в низких температурах для формирования бутонов.

ПОСЕВ:

Примулу обконика можно сеять в любое время года, но в Северном полушарии основной срок посева - июль – август (для цветения в феврале - марте). Семена присыпают очень тонким слоем субстрата или вермикулита, т.к. для прорастания нужен свет. Прорастание семян длится 10 – 20 дней.

- pH: 5,5-5,8
- ЕС: 0,5 – 0,75

На протяжении первых 5-ти дней (до появления зародышевого корешка) обеспечьте обильные поливы и уровень влажности 100%, после чего понизьте влажность до 50-70%. Рекомендуется обработать почву против корневых гнилей. Температура прорастания (до появления зародышевого корешка) – 22 - 24°C, после чего понизьте температуру до 18 - 20°C.

Освещение – до 30000 люкс, избегайте прямых солнечных лучей, поддерживайте влажность воздуха - на уровне 50 – 70%. При более высоких температурах у растений будут крупные листья, но не будет цветков. Обеспечьте горизонтальную вентиляцию, чтобы облегчить доступ кислорода к корневой системе. Примула обконика – влаголюбивое растение, но нельзя допускать застаивания влаги в горшке.

ПИКИРОВКА:

Через 6 – 7 недель после посева, можно сразу в горшки (8-9 см, или по 2-3 растения в горшок диаметром 10-12 см), но лучше делать сначала пикировку в кассеты с ячейки 5*5 см, а затем проводить перевалку в горшки.

- pH: 5,5-5,8
- ЕС: до 1,00 – примула обконика чувствительна к высоким уровням солей.

После пикировки поддерживайте температуру 16 - 18°C. После того, как растение хорошо укоренилось температуры можно понизить до 15 - 18 °C (днем), 10 - 13°C (ночью), что поможет вырастить более компактное растение. При более высоких температурах у растений будут крупные листья, но не будет цветков.

ОСВЕЩЕННОСТЬ:

В летнее время и на стадии молодой рассады растения нужно притенять. В стеклянных теплицах интенсивность окраски у примулы обконика более низкая, чем в плёночных или в открытом грунте из-за недостатка ультрафиолета.

УДОБРЕНИЯ:

Со стадии первых настоящих листьев все поливы необходимо совмещать с подкормками. Вегетативный рост – соотношение NPK 3:2:1. После появления цветочных почек 1:1:1. (В некоторых хозяйствах делают соотношение 1:1:2 и также получают хорошие результаты).

ОСОВНЫЕ БОЛЕЗНИ:

Вирус пятнистого увядания томата, питиоз.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ:

Трипсы, тля, белокрылка.

Примечание:

- В отличие от других примул, обконика не нуждается в периоде холодных температур для инициализации цветения. Серии Libre и Grace можно выращивать круглогодично.
- Некоторые гибриды примулы обконика могут вызвать аллергическую реакцию, которая вызвана наличием химического вещества примина. Одевайте латексные перчатки при работе с растениями. Тщательно мойте руки после работы.
- При выращивании примулы серии Libre F1, которая не содержит примина и не вызывает аллергии у человека, следует особенно тщательно следить, чтобы на растениях не появилась тля или белокрылка!

	ВЫСОТА	ШИРИНА	ЦВЕТУЩЕЕ РАСТЕНИЕ (НЕДЕЛИ)
<i>GraceTM F1</i>	20 – 25 см	15 – 20 см	16 – 20
<i>LibreTM F1</i>	25 – 30 см	25 – 30 см	16 – 20